



Warszawa, dnia 10 grudnia 2019 r.


**INSPEKCJA  
WETERYNARYJNA**  
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO LEKARZA  
WETERYNARII  
**Mirosław Welz**

**Wojewódzcy Lekarze Weterynarii**  
**- wszyscy -**

Nasz znak: GIWz-403-390/2019(1)

Dot. sprawy nr: GIWz-403-390/2019

pismo z  
dnia: 3 października 2019 r.

  
Nawiązując do pisma znak: GIWz-403-390/2019 z dnia 3 października 2019 r., dotyczącego polowań na obszarach: objętym ograniczeniami i zagrożenia, tj. wymienionym w części II i III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709/UE, uprzejmie informuję.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii może wprowadzić pewne ograniczenia przy prowadzeniu polowań i odłowów zwierząt łownych – każdorazowo po dokonaniu analizy ryzyka, o ile wykaże ona, że takie polowania lub odłowy powodują zagrożenie rozprzestrzeniania się ASF.

Zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, decyzje o ograniczeniach wymienionych w przepisach ww. rozporządzenia (§ 2 ust. 3) podejmowane są autonomicznie przez powiatowego lekarza weterynarii – po dokonaniu niezbędnych działań analitycznych, które powinny być oparte na przesłankach naukowych, uwzględniając sytuację epizootyczną w danym czasie i na danym terenie.


W przedmiotowej analizie warto zważyć, aby zakazy, o których mowa z jednej strony nie ograniczały optymalnej zakładanej redukcji populacji dzików, z drugiej zaś nie powodowały rozpraszania zwierząt zakażonych wirusem na tereny dotychczas wolne od choroby. Zgodnie z zaleceniami strategii dotyczącej zwalczania ASF w państwach członkowskich UE (dokument SANTE/7113/2015-Rev11), dotyczy to obszarów występowania świeżych zakażeń wirusem ASF u dzików, tj. takich, w odniesieniu do

których od daty ich potwierdzenia do czasu planowanych polowań zbiorowych w promieniu 5 km nie upłynął minimalny okres 2 miesięcy licząc od daty ostatniego przypadku.

Natomiast w odniesieniu do przypadków określanych jako „hot-spot” za obszar świeżego zakażenia należy uznać obszar wyznaczony w promieniu minimum 10 km od nich i tam zaleca się zupełne wstrzymanie się z aktywnością łowiecką (poza uzasadnionym epizootycznie odstrzałem sanitarnym), przez analogiczny okres minimum 2 miesięcy. W tym czasie należy prowadzić aktywne przeszukania terenu oraz odłów zwierząt przy użyciu pułapek żywołownych, prowadząc intensywne polowania poza tymi strefami.

Reasumując, w ocenie Głównego Lekarza Weterynarii jedną z istotnych przesłanek wykluczających prowadzenie polowań zbiorowych na dziki jest występowanie świeżych przypadków choroby w okresie 2 miesięcy poprzedzających takie polowania oraz dotyczy obszaru minimum 5 km wokół miejsc ich stwierdzenia, a w przypadkach „hot-spot” analogiczny obszar o promieniu minimum 10 km.

Jednocześnie, należy przyjąć, że na obszarach objętych regionalizacją, gdzie nie występują świeże przypadki ASF u dzików, decyzja o zakazie odłów i polowań powinna być podejmowana tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne ze względu na jednoznaczne przesłanki epizootyczne.

  
ZASTĘPCA  
GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII  
dr n/wet. Mirosław Welz